

多发伤患者急诊抢救中急诊护理干预的应用

张贺阳

唐山市曹妃甸区临港医院 河北唐山

【摘要】目的 分析在对多发伤患者进行急诊抢救的过程中将急诊护理干预进行运用的作用。**方法** 结合对比护理评估的形式展开本次研究, 共计在 2021 年 2 月至 2022 年 4 月急诊接收的多发伤患者中选取 88 例为对象, 按照数字表随机抽样的形式, 取其中的 44 例, 在进行急诊救治的过程中展开常规护理, 作为对照组, 在对剩下患者进行急诊救治的过程中则需要将急诊护理干预展开运用, 作为观察组。分析两组患者在急诊救治过程中护理干预层面的差异。**结果** 结合护理对比可以发现, 在术前抢救时间、抢救成功率以及患者护理满意度方面, 观察组均存在有明显优势, $P < 0.05$ 。**结论** 在对多发伤患者进行急诊抢救的过程中将急诊护理干预进行运用, 可以有效缩短患者的术前抢救时间, 提升该部分患者抢救成功率, 增加患者对临床护理工作的满意度。

【关键词】 多发伤患者; 急诊抢救; 急诊护理

【收稿日期】 2023 年 2 月 22 日

【出刊日期】 2023 年 4 月 19 日

【DOI】 10.12208/j.cn.20230199

Application of emergency nursing intervention in emergency rescue of patients with multiple injuries

Heyang Zhang

Lingang Hospital, Caofeidian District, Tangshan, Hebei

【Abstract】 Objective To analyze the effect of emergency nursing intervention in the process of emergency rescue for patients with multiple injuries. **Methods** This study was carried out in combination with the form of comparative nursing evaluation. A total of 88 patients with multiple injuries admitted to the emergency department from February 2021 to April 2022 were selected as the objects. According to the form of random sampling in the number table, 44 of them were selected to carry out routine nursing care in the process of emergency treatment as the control group. In the process of emergency treatment for the remaining patients, emergency nursing intervention should be applied as the observation group. To analyze the difference of nursing intervention level between the two groups in emergency treatment. **Results** Combined with nursing comparison, it can be found that the observation group has obvious advantages in preoperative rescue time, rescue success rate and nursing satisfaction of patients, $P < 0.05$. **Conclusions** The application of emergency nursing intervention in the process of emergency rescue for patients with multiple injuries can effectively shorten the preoperative rescue time of patients, improve the success rate of rescue of these patients, and increase the satisfaction of patients with clinical nursing work.

【Keywords】 Patients with multiple injuries; Emergency treatment; Emergency care

在临床常见的急诊类病症中, 多发性损伤属于最为常见的类型, 该部分患者多因突发性事件所导致, 主要表现为四肢或者器官等多发性创伤, 存在有一定的风险性, 甚至会直接危及到患者生命安全。且随着交通事故以及建筑施工施工等因素的影响, 多发伤患者的数量正以较快的速度在增加。在对该部分患者进行急诊救治的过程中, 为促使患者病症可以迅速进行稳定, 降低病症对患者所造成的负面影响, 更需要在展开急诊救治的过程中开展对应的护理工作^[1]。将急

护理干预运用到该部分患者急诊救治的过程中逐步被急诊所重视, 从刘珂娜等^[2]研究可见, 在该护理干预的作用下, 可以进一步提升对多发伤患者的急诊救治效果。本次研究就主要对急诊护理干预在多发伤患者救治中的作用进行分析。

1 资料与方法

1.1 一般资料

结合对比护理评估的形式展开本次研究, 共计在 2021 年 2 月至 2022 年 4 月急诊接收的多发伤患者中选

取 88 例为对象,按照数字表随机抽样的形式,取其中的 44 例,在进行急诊救治的过程中展开常规护理,作为对照组,在对剩下患者进行急诊救治的过程中则需要将急诊护理干预展开运用,作为观察组。在患者组成方面,对照组中包括有男性患者 23 例,女性患者 21 例,年龄分布在 34—63 岁间,对应年龄均值为(54.23±1.38)。而观察组中则存在有男性 22 例,女性 22 例,年龄分布在 33—64 岁间,对应年龄均值为(53.02±1.74)。结合对两组基本数据对比, $P>0.05$ 。纳入标准:本次研究纳入患者均在创伤发生后 1h 内送至本院进行治疗;患者无凝血功能性疾病;无肿瘤类疾病;无药物过敏症状。排除标准:多发伤大出血患者;入院时已经处在休克状态且生命体征严重偏离正常范围。

1.2 方法

对照组在进行急诊救治的过程中对应的护理工作都结合急诊有关规定进行展开。在患者到达医院后,护理人员需要立即针对患者的各方面情况进行评估,包括患者血压、心率等基本生命指标,并立即展开补液等治疗操作。做好和急救医生的各方面救治配合工作,确保对应的救治工作可以顺利展开。在对观察组进行护理的过程中则需要将急诊护理进行运用:

(1) 做好入院前的护理工作。急救中心在接到对应的救助电话后,需要立即进行出诊,且在到达途中需要通过电话的方式对患者的各方面情况进行了解,并指导现场人员做好常规紧急处理工作。在到达现场后,护理人员需要对患者的各方面情况进行综合性评估,并对致命性创伤进行紧急处理,尤其对于外部创口展开紧急的止血等操作。在患者出血等症状稳定后,迅速将患者转移至救护车并送往医院。在回院的过程中,护理人员需要密切关注患者生命指标的变化,并将患者的各方面情况及时向院内护理人员禀告,以便其可以提前做好准备。对于意识清晰患者,在回院过程中,护理人员需要做好患者心理建设工作,耐心为患者讲解当前急诊对于多发伤患者救治的有效性,避免患者过于担忧。同时需要简单和患者以及家属进行沟通,针对患者出现多发伤的原因进行了解,可以为治疗方案的制定提供指导。此外,需要及时询问患者是否存在有其他慢性疾病或者身体其他部位是否存在有不适感,评估患者是否存在有潜在损伤,以便及时进行诊断和处理。

(2) 开通绿色通道。因该部分患者多数损伤较为严重,急诊科需要对患者开通绿色通道,在到达医院后护理人员需要立即将患者送至抢救室,以便急救医

师开展对应的救治操作。且同时需要指导患者家属等做好对应的治疗配合工作,按照先治疗后办理手续的原则开展对应的救治工作。针对部分病症较为严重患者,在开展各方面检查的过程中,可优先进行,确保可以在最短时间内得到患者的各方面检查结果,针对患者损伤情况进行准确评估。

(3) 高效评估。护理人员需要对患者在急救过程中血压、心率、脉搏等的变化情况进行准确的评估,并及时观察患者四肢等部位是否还有损伤或者活动性出血的情况,并及时给与针对性处理。此外,护理人员需要结合患者的损伤情况为患者制定全方面的护理干预方案,为患者提供针对性的护理支持。在患者出现血氧指标异常或者血压、心律异常症状时,可及时进行处理,促使患者生命指标可以迅速稳定。且在对患者用药过程中,需要结合患者体质情况以及以往病史等,准确分析患者在用药过程中可能出现的不良反应等,并提前制定针对性处理方案。

(4) 心理干预。因病症发生较为突然,患者在治疗过程多数会存在有一定的负面心理,表现为焦虑、紧张等,且部分患者更可能出现过激的行为,会在一定程度上影响到各方面急救操作的顺利性。在急救护理的过程中,护理人员则需要做好患者的心理疏导工作,告知患者当前急救方案的有效性,告知患者在对应救治操作的作用下,可以促使其病情迅速进行稳定,不必过于担心。若患者因疼痛等因素存在有一定的过激行为,护理人员则需要结合患者的具体情况对患者进行对应的约束,以免影响到对应的救治工作。

1.3 观察指标

在本次研究中需对两组术前抢救时间、抢救成功率以及患者护理满意度进行统计。

1.4 统计学方法

本次对比护理过程中的对应数据都按照 SPSS20.0 进行处理,按照百分数对计数数据进行表示,卡方检测,对应计量数据则按照均值±标准差进行处理,t 检测, $P<0.05$ 差异具备统计学意义。

2 结果

在抢救时间方面,观察组为(56.23±5.23) min,对照组则为(75.22±7.12) min,对比, $t=11.882$, $P=0.001<0.05$ 。在抢救成功率上,观察组为 97.73%(43/44),对照组则为 84.09%(37/44),对比 $\chi^2=14.022$, $P=0.001<0.05$ 。对两组在治疗过程中的护理满意度对比,观察组护理满意度明显高于对照组, $P<0.05$,详见下表 1。

表 1 两组护理满意度对比[n, (%)]

| 组别 | 例数 | 满意 | 较为满意 | 不满意 | 满意度 |
|----------|----|------------|------------|------------|------------|
| 观察组 | 44 | 24 (54.55) | 18 (40.91) | 2 (4.54) | 42 (95.46) |
| 对照组 | 44 | 20 (45.45) | 14 (31.82) | 10 (22.73) | 34 (77.27) |
| χ^2 | - | 0.825 | 1.728 | 13.052 | 13.052 |
| P | - | 0.524 | 0.728 | 0.001 | 0.001 |

3 讨论

多发性外伤属于急诊科接诊量较大的病症类型,该部分患者多数损伤较为严重,对于部分腹部出血患者以及四肢等部位活动性出血患者等,若不及时展开对应的救治治疗,则会直接危及到患者的生命安全^[3-4]。急诊科在对该部分患者进行急救的过程中,为促使患者的各方面症状可以迅速进行稳定,需要及时结合患者的损伤特点进行针对性的救治。此外,在对该部分患者进行急救的过程中,有效的缩短抢救时间对于保障患者的生命安全以及帮助患者恢复等均存在有极为重要的作用^[5-6]。因此,在对该部分患者展开急救的过程中各个救治环节均需要做到迅速、高效。从优化急诊护理干预的角度出发对该部分患者进行救治效果提升逐步被急诊科所重视。

我院针对急诊护理干预进行优化,对该部分患者在救治过程中的各护理环节效率进行提升。通过在到达患者所在地前,及时对患者各方面情况进行了解,并指导现场人员展开常规的处理工作,可以在一定程度上缓解患者的对应症状。同时,及时对患者开通绿色通道,能够确保患者在最短的时间内得到针对性的治疗,降低损伤对患者所造成的影响^[7-8]。同时,在急诊护理的过程中及时开展对该部分患者的心理疏导工作,可以对患者在救治过程中的心理状态进行改善,对于增加患者和各方面治疗操作的依从性等均存在有极为重要的作用。在救治过程中密切关注患者生命指标变化,可以及时发现患者的突发性症状,并及时进行处理,保障救治的综合效果^[9-10]。结合本次对比护理探究可以发现,在常规护理的基础上将急诊护理干预运用到多发伤患者救治的过程中,可以实现对抢救成功率的有效提升,缩短患者的救治时间,更可以促使患者对临床护理工作的满意度进行提升,对于提升急诊科对多发性创伤患者的综合治疗效果存在有极为重要的意义。

综合本次研究,急诊科在对多发伤患者进行救治的过程中可以将急诊护理干预进行运用,综合提升对

多发伤患者的急救效率,保障患者的生命安全。

参考文献

- [1] 赵志勇.多发伤伴骨盆骨折患者早期急诊救治流程的建立方法及应用价值分析[J].中国药物与临床,2021,21(16):2814-2816.
- [2] 刘珂娜.三维结构护理对急诊多发伤患者救治效果的影响[J].黑龙江医学,2021,45(16):1709-1710+1713.
- [3] 任广琴,李永辉,刘贵英.优化型集束化护理对急诊高处坠落性多发伤患者疗效的影响[J].深圳中西医结合杂志,2021,31(15):188-189.
- [4] 王晶晶,赵妮娜,张辰露.分级分区分流急诊护理在多发伤患者中的应用[J].中国乡村医药,2021,28(05):72-73.
- [5] 冯兰棱.以核心能力为导向急诊专科护士培训方案的构建[D].兰州大学,2021.
- [6] 赵卫玲,赵琳,李青霞,于小税.急救护理流程在严重多发伤患者急救中的应用[J].黑龙江中医药,2020,49(06):400-401.
- [7] 黄光钊.改良早期预警评分在急诊多发伤患者护理中的效果观察[J].医学理论与实践,2020,33(18):3102-3104.
- [8] 谢宁.优化急诊护理流程在严重创伤病患者救治中应用探讨[J].实用临床护理学电子杂志,2020,5(13):15.
- [9] 李毅.心理护理干预在多发伤患者急诊救治中的应用价值[J].河南医学研究,2019,28(11):2088-2089.
- [10] 行文静.急诊护理在多发伤患者急诊抢救中的应用价值分析[J].首都食品与医药,2018,25(18):98.

版权声明: ©2023 作者与开放获取期刊研究中心(OAJRC)所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



OPEN ACCESS