

综合护理干预在小儿先天性多指畸形手术室护理中的应用效果

李晓晨, 董磊磊

中国人民解放军海军第九七一医院 山东青岛

【摘要】目的 讨论研究在小儿先天性多指畸形手术室护理中开展综合护理干预工作的价值作用。**方法** 将 2021 年 9 月到 2022 年 9 月期间院内的 68 例小儿先天性多指畸形患者纳入研究范围, 利用随机分配法划分为对照组 (采取常规模式开展护理工作)、观察组 (采取综合护理干预模式开展护理工作), 观察并比较两组并发症发生情况、住院治疗时长, 观察并比较两组家属对护理工作满意情况。**结果** 将两组接受不同护理工作后相关数据信息输入到统计学系统中处理得出结果 P 值 <0.05 , 差异显著, 观察组整体并发症发生情况、住院治疗时长、家属对护理工作满意度等各项数据信息均明显比对照组更具优势。**结论** 在小儿先天性多指畸形手术室护理中开展综合护理干预工作可减少并发症对患儿不良影响, 让患儿尽早出院, 增强家属对护理工作满意度。

【关键词】 综合护理干预; 小儿先天性多指畸形术; 手术室护理

【收稿日期】 2023 年 3 月 11 日

【出刊日期】 2023 年 5 月 15 日

【DOI】 10.12208/j.cn.20230216

Application effect of comprehensive nursing intervention in operation room nursing of children with congenital polydactyly

Xiaochen Li, Leilei Dong

Navy 971 Hospital, Qingdao, Shandong

【Abstract】 Objective To discuss the value of comprehensive nursing intervention in the operation room nursing of children with congenital polydactyly. **Methods** From September 2021 to September 2022, 68 cases of children with congenital polydactyly in hospital were included in the study. They were randomly divided into the control group (using the conventional mode to carry out nursing work) and the observation group (using the comprehensive nursing intervention mode to carry out nursing work). The occurrence of complications and the length of hospitalization in the two groups were observed and compared, and the satisfaction of family members in the two groups was observed and compared. **Results** The relevant data information of the two groups after receiving different nursing work was input into the statistical system and the result was $P<0.05$, with significant difference. The observation group's overall complications, length of hospitalization, family members' satisfaction with nursing work and other data information were significantly superior to the control group. **Conclusion** Comprehensive nursing intervention in the operation room of children with congenital polydactyly can reduce the adverse effects of complications on children, enable children to leave hospital as soon as possible, and enhance the satisfaction of family members with nursing work.

【Keywords】 Comprehensive nursing intervention; Operation of congenital polydactyly in children; Operating room nursing

小儿先天性多指畸形为儿科常见症状, 也就是多指症, 主要是女性妊娠早期阶段服用一些特殊药物或者受到辐射而引起的, 目前针对该种疾病主要会利用小儿先天性多指畸形术进行治疗。但是在实际治疗中还需要做好相关护理工作, 保证护理质量, 才能提升预后, 为患儿健康发育提供一定保障^[1]。随着现代医疗卫生事业的不断发展, 综合护理干预等多种新型护理

模式被逐渐运用到临床护理中, 并取得了不错效果^[2-3], 这为小儿先天性多指畸形手术室护理研究提供了新方向。文中对小儿先天性多指畸形手术室护理中开展综合护理干预工作的价值进行了分析, 具体如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

将 2021 年 9 月到 2022 年 9 月期间院内的 68 例小

儿先天性多指畸形患者纳入研究范围, 随机编号后利用计算机随机抽取方式划分为对照组与观察组, 两组患者占比为 35: 33。对照组: 患儿男女占比为 19: 16, 年龄最小 1 岁、最大 6 岁, 年龄平均值为 (2.31 ± 0.57) 岁; 家属男女占比为 11: 24, 年龄最小 22 岁、最大 46 岁, 年龄平均值为 (32.02 ± 1.03) 岁。观察组: 患儿男女占比为 18: 15, 年龄最小 1 岁、最大 6 岁, 年龄平均值为 (2.28 ± 0.59) 岁; 家属男女占比为 10: 23, 年龄最小 22 岁、最大 46 岁, 年龄平均值为 (32.10 ± 1.07) 岁。纳入标准: 均接受小儿先天性多指畸形术; 家属均在了解此次研究活动后, 在相关知情同意文件上签署了姓名。排除标准: 中途退出者; 同时合并其他严重疾病者。医院伦理委员会同意此次研究活动, 并予以审批。将各个患儿、家属基础资料输入统计学系统, 处理后 P 值 > 0.05, 无显著差异, 具有可比性。

1.2 方法

(1) 对照组

采取常规模式开展护理工作, 严格按照相关标准术前口头告知家属相关注意事项, 做好手术准备工作, 术中辅助医师完成手术操作, 术后做好病房巡视工作。

(2) 观察组

采取综合护理干预模式开展护理工作: ①结合医院科室情况组建对应的综合护理干预小组, 定期组织小组成员参加学习培训活动, 确保各个护理人员均掌握综合护理理念知识与操作技巧、专科护理知识, 不断提升护理人员专业水平, 同时要求护理人员树立相应的责任意识、安全意识, 主动将自身护理工作落实到位, 为护理工作顺利开展提供一定保障。②术前与家属做好交流与沟通, 让家属了解手术重要性与流程、护理重点与相关注意事项, 鼓励家属参与到护理中, 对患儿进行有效安抚, 提升家属与患儿依从性。③术前需要运用语言、肢体动作等对患儿进行安抚, 可让家属陪伴患儿进行手术治疗, 避免患儿过于害怕。④术后需要辅助患儿保持去枕平卧状, 严密观察患儿各项生命体征变化情况, 并做好相关记录; 将患儿患肢进行适当抬升, 按时检查患肢是否存在异常情况, 包

括末梢血运是否正常、是否存在肿胀情况、颜色是否正常、皮肤温度是否正常、伤口是否出现渗液或者渗血, 并针对异常情况及时采取相应处理措施, 在对患儿开展护理操作与伤口换药时, 应采取播放动画方式分散患儿注意力, 还可以对患儿配合行为进行鼓励与夸奖, 肯定患儿价值, 让患儿可以有效配合护理人员完成护理操作。⑤对患儿伤口疼痛情况进行评估, 结合患儿伤口愈合程度与哭闹情况合理采取对应的处理措施, 减轻患儿生理痛苦。在对患指进行固定时, 需要做好保护工作, 降低烫伤或者冻伤等不良事件发生风险; 告知家属患肢活动方法, 引导并辅助患儿进行肢体训练活动, 促进康复。

1.3 判断标准

(1) 观察并比较两组并发症发生情况、住院治疗时长, 并发症包括关节僵硬、呼吸道感染、伤口感染以及静脉危象。(2) 观察并比较两组家属对护理工作满意情况, 依照医院多名专家共同制定满意度调查表, 分值在 1-100 分之间, 得分在 1 到 59 分范围内可判断为不满意, 得分在 60 到 85 分之间可判断为满意, 得分在 86 到 100 分之间可判断为十分满意, 总满意度为十分满意/总例数+满意/总例数, 再 × 100%。

1.4 统计学方法

使用 SPSS20.0 软件分析数据, 使用 t 和 $\bar{x} \pm s$ 表示计量资料, 使用卡方和 % 表示计数资料, $P < 0.05$ 为有统计学意义。

2 结果

2.1 并发症与住院治疗时长

将两组接受不同护理工作后相关数据信息输入到统计学系统中处理得出结果 P 值 < 0.05, 差异显著, 观察组整体并发症发生情况、住院治疗时长等各项数据信息均明显比对照组更具优势。详见表 1。

2.2 满意度

将两组接受不同护理工作后相关数据信息输入到统计学系统中处理得出结果 P 值 < 0.05, 差异显著, 观察组整体家属对护理工作满意度等各项数据信息均明显比对照组更具优势。详见表 2。

表 1 两组患儿并发症发生率与住院治疗时长比较 [(n, %) , ($\bar{x} \pm s$)]

组别	例数	并发症	住院治疗时长 (d)
观察组	33	1 (3.03)	4.02 ± 0.18
对照组	35	5 (14.28)	6.21 ± 1.03
χ^2/t		8.004	12.037
P		0.004	0.001

表 2 两组家属满意度比较 (n,%)

组别	十分满意	满意	不满意	总满意
观察组 (n=33)	20 (60.60)	12 (36.36)	1 (3.03)	32 (96.96)
对照组 (n=35)	15 (42.85)	15 (42.85)	5 (14.28)	30 (85.71)
χ^2	6.308	0.880	8.004	7.995
<i>P</i>	0.012	0.348	0.004	0.004

3 讨论

以往针对小儿先天性多指畸形患儿的手术室护理工作, 主要会采取常规模式进行, 但是不能在最大程度上保证护理质量, 降低预后^[4]。而综合护理干预模式主要是指, 将护理程序作为核心, 实现护理程序系统化管理, 明确各个护理环节^[5-9], 提升不同环节护理工作协调性, 进而将护理服务水平与质量提升到新高度。将该种护理模式运用到小儿先天性多指畸形手术室护理中, 能够将各项护理工作落实到位, 保证护理全面性、有效性、安全性, 将关节僵硬、呼吸道感染、伤口感染以及静脉危象等并发症发生风险控制在合理范围, 让患儿尽早出院, 提升家属对护理工作满意度^[10-13], 减少家属与护理人员之间矛盾纠纷发生风险。结合文中研究结果, 将两组接受不同护理工作后相关数据信息输入到统计学系统中处理得出结果 *P* 值 <0.05, 差异显著, 观察组整体并发症发生情况、住院治疗时长、家属对护理工作满意度等各项数据信息均明显比对照组更具优势^[14-17]。

可见, 在小儿先天性多指畸形手术室护理中开展综合护理干预工作可减少并发症对患儿不良影响, 让患儿尽早出院, 增强家属对护理工作满意度。

参考文献

[1] 辛广萍. 小儿先天性多指畸形术后护理体会[J]. 健康之友,2021(16):189-190.

[2] 张颖. 综合护理小儿重症肺炎并发呼吸衰竭的临床效果观察[J]. 基层医学论坛,2019,23(9):1230-1231.

[3] 刘钰,周真真. 综合护理运用于小儿肺炎的临床效果及对睡眠质量的影响[J]. 世界睡眠医学杂志, 2022, 9(4): 699-701.

[4] 梁丽平,邢梅利,白翠芹. 小儿先天性多指畸形术后护理体会[J]. 美中国际创伤杂志,2018,17(4):60-61.

[5] 陈岑,寿学玲,季海艳. 围术期护理在小儿先天性多指畸形中的应用[J]. 中国保健营养,2019,29(34):205.

[6] 袁文波. 围术期综合护理在小儿先天性多指畸形手术治疗中的应用[J]. 母婴世界,2020, 6(28):170.

[7] 梁丽平,邢梅利,白翠芹. 小儿先天性多指畸形术后护理体会[J]. 美中国际创伤杂志,2018,17(4):60-61.

[8] 解鲜冬,马殿群,石海霞. 围术期综合护理在小儿先天性多指畸形手术治疗中的应用[J]. 贵州医药, 2018, 42(3): 364-365.

[9] 于艳丽,刘檬,毕彦聪,等. 小儿先天性多指畸形围术期实施综合护理的效果观察[J]. 药店周刊,2021,30(31):122.

[10] 王舒. 围术期综合护理在小儿先天性多指畸形手术治疗中的应用[J]. 健康之友,2020, 12(1):32.

[11] 韩清月.先天性多指畸形手术患儿实施快速康复护理干预的效果观察[J].中国伤残医学, 2022(002):030.

[12] 袁文波.围术期综合护理在小儿先天性多指畸形手术治疗中的应用[J]. 2020.

[13] 梁丽平,邢梅利,白翠芹.小儿先天性多指畸形术后护理体会[J].美中国际创伤杂志, 2018, 17(4):2.

[14] 冯亚东,王文华.关于腹腔镜下小儿先天性巨结肠根治术的手术室全期护理干预研究[J].中国农村卫生, 2016 (09X):2.

[15] 叶青,汪秀红.综合护理干预在急性脊髓损伤甲强龙冲击治疗中的效果观察[J].贵州医药, 2018, 42(3):2.

[16] 冯亚东,王文华.关于腹腔镜下小儿先天性巨结肠根治术的手术室全期护理干预研究[J]. 2022(9).

[17] 刘伍妹.小儿先天性心脏病合并气管畸形围术期的护理干预[J].基层医学论坛, 2018, 22(3):2.

版权声明: ©2023 作者与开放获取期刊研究中心(OAJRC)所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

