

小儿预防接种中社区护理干预的疗效观察

俞方

浙江省嘉兴市平湖市钟埭街道社区卫生服务中心 浙江嘉兴

【摘要】目的 观察小儿预防接种中社区护理干预的效果。**方法** 本次的研究时间在 2021.1 月至 2022.1 月, 研究对象为上述期间我社区医院接受预防接种的 400 例小儿及小儿家长, 根据护理干预方式不同分成两组, 接受社区护理干预的为研究组, 其中有 200 例小儿及小儿家长, 接受常规护理干预的为对照组, 其中有 200 例小儿及小儿家属, 对两组分别干预后的全部接种率、家长预防接种知识掌握情况以及家长护理满意度评分进行对比。**结果** 研究组小儿家长的预防接种知识掌握情况以及护理满意度评分明显高于对照组, $P < 0.05$; 研究组的全部接种率明显高于对照组, $P < 0.05$ 。**结论** 社区护理干预用于小儿预防接种中, 可提高疫苗接种率, 让小儿家长掌握更多预防接种知识, 满意护理人员工作, 值得运用。

【关键词】 小儿预防接种; 社区护理干预; 疗效观察

【收稿日期】 2022 年 10 月 22 日 **【出刊日期】** 2022 年 12 月 13 日 **【DOI】** 10.12208/j.ijmd.20220308

Observation on the effect of community nursing intervention in children's vaccination

Fang Yu

Zhongdai Community Health Service Center, Pinghu City, Jiaxing City, Zhejiang Province

【Abstract】 Objective: To observe the effect of community nursing intervention in children's vaccination. **Methods:** The study was conducted from November 2021 to February 2022.1. The subjects were 400 children and their parents who received vaccination in our community hospital during the above period. They were divided into two groups according to the different nursing intervention methods. The study group was the one who received community nursing intervention, including 200 children and their parents. The control group was the one who received routine nursing intervention, including 200 children and their families. The total vaccination rate The parents' knowledge of vaccination and the scores of parents' satisfaction with nursing were compared. **Results:** The knowledge of vaccination and nursing satisfaction scores of parents in the study group were significantly higher than those in the control group ($P < 0.05$); The total vaccination rate of the study group was significantly higher than that of the control group ($P < 0.05$). **Conclusion:** The application of community nursing intervention in children's vaccination can improve the vaccination rate, enable children's parents to master more vaccination knowledge, and satisfy the work of nursing staff, which is worth using.

【Keywords】 childhood vaccination; Community nursing intervention; Efficacy observation

现如今, 小儿预防接种得到了社会的广泛关注。在预防接种过程中, 主要是把人工培育经处理后的疫苗接种到健康儿童的体内, 让小儿体内形成抗体, 抵抗各种疾病^[1]。因为小儿的年龄十分小, 在机体功能上还未发育完全, 所以容易感染各种细菌或者是病毒, 对小儿的身体健康造成不良影响^[2]。通过小儿预防接种工作的开展, 会起到一定的保护作用, 让小儿远离流感的侵害, 维护小儿健康成长^[3]。在

预防接种阶段小儿家长也应当配合医务人员工作, 接受相关的护理干预, 以此让小儿预防接种质量显著提升^[4]。故本次研究将 400 例接种儿童当作研究对象, 通过不同护理干预措施的应用, 对两组小儿预防接种的效果展开比较。

1 资料与方法

1.1 一般资料

研究时间为 2021 年 1 月份至 2022 年 1 月份,

研究对象为上述时间段进行预防接种的小儿，根据护理方法的不同进行分组，接受常规护理的为对照组，其中有 200 例小儿，接受社区护理干预的为研究组，其中有 200 例小儿。在对照组的 200 例小儿当中，有 110 例男性儿童以及 90 例女性儿童，年龄在三个月到六岁，平均年龄为 (3.18 ± 1.08) 岁。而研究组中有 109 例男性儿童以及 91 例女性儿童，年龄在三个月到七岁之间，平均年龄为 (3.49 ± 1.17) 岁，经过比较两组小儿的性别以及年龄资料，得知无统计学意义， $P > 0.05$ ，可比较。

1.2 纳入排除标准

(1) 纳入标准

纳入小儿对研究中接种的疫苗并无过敏反应；纳入小儿家长在研究之初已经签署知情同意书；小儿家长沟通能力正常。

(2) 排除标准

排除对接种疫苗过敏的小儿；排除不配合的小儿；排除一般资料不完整的小儿。

1.3 方法

对照组中的小儿接受常规护理，先将疫苗摇匀之后，对儿童接种位置消毒，予以一定的心理安慰，并为小儿家长讲解预防接种的相关注意事项以及保健知识。

研究组的小儿接受社区护理干预，具体的措施如下：第一，接种现场干预。①在小儿接种疫苗前，护理人员应当和小儿家长进行联系，用诚恳真诚的态度告知小儿家长疫苗接种后容易出现的不良反应，让小儿家长知晓接种疫苗前后的注意事项，对各种突发状况提前做好心理准备，配合护理人员工作，顺利完成接种。②接种过后需要让小儿及小儿家长留观半小时之上，这一期间需要观察接种后小儿的反应，如果存在异常，要立刻进行处置，并安抚家属。在这期间进行预防接种健康教育。留观完成后，需要为小儿家长发放预防接种告知手册，叮嘱家属下次按时完成小儿预防接种，了解接种的重要性。第二，社区医院非现场干预。由于接种疫苗的小儿年龄在 0~6 周岁的居多，一般需要接受 20 余针次的疫苗。对此，社区医院可以在留观室及等候区张贴海报，使用多媒体设备播放有关录像，通过个体指导或者是集体教育等方式，为小儿及小儿家长普及计划免疫知识。另外，在社区医院管理的范

围之内，可以联通社区居委会定期展开预防接种宣教，对家长以及即将生产的准家长展开健康宣讲。除此之外，也可以使用官方公众号完成科普文章的推送。对于一些文化水平不高的人群，可通过宣传页的发放或者是海报的张贴，使人们的疫苗预防接种的意识明显提升，尽快带领自家孩子完成预防接种。

1.4 观察指标及效果评价标准

观察小儿全部接种率；观察小儿家长的预防接种知识掌握情况；观察小儿家长的护理满意度评分。

1.5 统计和分析

把 SPSS22.0 统计学软件当作数据处理的主要工具，分析处理资料，计数资料用 % 表示，计量资料用 $(\bar{x} \pm s)$ 表示，检验分别采用 χ^2 和 t 检验，有统计学差异时， $P < 0.05$ 。

2 结果

2.1 小儿全部预防接种率

研究组中的 200 例小儿，全部接种的例数为 198 例，接种率为 99%，而对照组中的 200 例小儿，全部接种的例数为 185 例，接种率 92.5%，经比较得知 χ^2 值为 10.3824，P 值为 0.0012， $P < 0.05$ 。

2.2 干预后小儿家长对预防接种知识的掌握情况

干预后研究组小儿家长的预防知识掌握情况明显优于对照组评分， $P < 0.05$ ，见表 1。

表 1 干预后小儿家长对预防接种知识的掌握情况比较
($\bar{x} \pm s$)

组别	例数	疫苗 接种时间	接种后 禁忌症	接种前后 注意事项
研究组	200	9.25±0.68	9.48±0.35	9.39±0.51
对照组	200	7.20±0.72	7.18±0.68	7.25±0.49
t		29.2738	42.5307	42.7914
P		0.0000	0.0000	0.0000

2.3 护理后小儿家长的护理满意度评分

护理干预后，研究组中的小儿家长十分满意的例数有 110 例、满意的例数为 87 例，不满意的例数为 3 例，护理满意度评分为 98.5%，而对照组中的小儿家长十分满意的有 100 例、满意的有 80 例、不满意的有 20 例。护理满意度评分为 90%，经比较

得知 χ^2 值为13.3318, P值为0.0002。

3 讨论

对于小儿来说, 他们的年龄比较小, 在身体各项功能上还没有发育完全, 所以和成年人进行身体素质的比较抵抗力较弱, 极易感染上各种疾病^[5]。对此, 若想提升小儿的抵抗力, 让他们远离细菌和病毒的侵扰, 需要定期带领小儿完成预防接种, 使小儿的免疫力大幅度提高, 减少他们患病的概率^[6]。在小儿预防接种期间社区护理干预的落实, 可以缓解小儿及小儿家长的不良情绪, 使他们掌握一定的知识, 并降低接种后不良反应发生的概率, 使小儿家长更加满意护理人员的工作^[7]。

通过社区预防接种护理干预, 可以明显增高小儿全部疫苗的接种率, 让小儿家长掌握更多的疫苗知识, 了解疫苗接种的具体时间, 使免疫接种率大幅度提升^[8]。并且, 预防接种属于计划免疫工作中的主要内容, 因为许多的人缺乏医疗知识, 对预防接种的重要性并不了解, 所以对预防免疫阶段生成的各种不良反应存在严重误解^[9]。这也对预防免疫工作的展开受到了影响。对此, 要积极落实社区护理干预, 通过各种措施的使用, 使小儿家长更加配合护理人员的工作, 使疫苗接种覆盖率明显增高^[10]。

通过接种前对小儿家长的心理疏导, 提前让家长行程心理建设, 在面对各种突发事件时可以沉着冷静的面对, 更为有效的和护理人员进行交流。在实际的小儿预防接种工作中, 护理人员应当用自身专业性打动小儿家长, 构建出和谐友好的护患关系。

在本次研究之中, 从两组的预防接种情况上进行比较得知研究组小儿疫苗接种率明显高于对照组。P<0.05; 研究组小儿家长对预防接种知识的知晓率明显高于对照组, p<0.05; 研究组小儿家长的护理满意度评分明显高于对照组小儿家长的护理满意度评分, 差异有统计学意义。

综上所述, 小儿预防工作中开展有效的社区护理干预, 不但让疫苗接种率明显增高, 还会让小儿家长掌握更多的预防接种知识, 使小儿家长对护理

人员更加认可满意, 定时按时的完成疫苗接种, 为我国计划免疫工作的落实提供帮助, 其具有临床应用的价值与意义。

参考文献

- [1] 陈艳娇. 全程护理干预对学龄前期小儿预防接种配合度及患儿家属护理工作满意度的影响[J]. 黑龙江医药科学, 2019,42(1):160-161.
- [2] 颜家平. 护理干预在社区小儿预防接种中的效果观察[J]. 中西医结合心血管病电子杂志,2019,7(19):144-145.
- [3] 黄基玲. 全程护理干预在小儿预防接种工作中的效果研究[J]. 世界最新医学信息文摘(连续型电子期刊),2019,19(54):324-325.
- [4] 陈娜娜. 解析护理干预在社区小儿预防接种中的应用效果[J]. 中国保健营养,2019,29(29):52.
- [5] 忻文君. 小儿预防接种中社区护理干预对不良反应及满意度的影响[J]. 家庭医药,2019(6):304.
- [6] 刘明珠. 护理干预在小儿预防接种中的应用效果分析[J]. 中国保健营养,2019,29(13):249.
- [7] 吴永霞,任然,王杰. 全程护理干预在小儿预防接种工作中的效果研究[J]. 系统医学,2020,5(9):180-182.
- [8] 张红. 护理干预在社区小儿预防接种工作中的效果[J]. 当代护士(中旬刊),2020,27(7):97-100.
- [9] 梅莉. 小儿预防接种中社区护理干预对不良反应及满意度的影响分析[J]. 医学美学美容,2020,29(21):17-18.
- [10] 张茂萍. 小儿预防接种中的常见不良反应与护理方案分析[J]. 世界最新医学信息文摘(连续型电子期刊),2020,20(A0):130-131.

版权声明: ©2022 作者与开放获取期刊研究中心(OAJRC)所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



OPEN ACCESS